





# Etablering av rajsvingel



3 års försök genomfördes i rajsvingelsorterna Hykor och Paulita. Hykor är en korsning mellan rörsvingel och italienskt rajgräs och påminner i sitt växtsätt mest om rörsvingel. Försöken i Hykor visar bäst resultat vid 12 cm eller 24 cm radavstånd och med låg utsädesmängd. Skillnaden i skörd mellan 12 cm radavstånd och 36 cm radavstånd är statistisk signifikant. De övriga skillnaderna är det inte.





# Etablering av rajsvingel

3 års försök genomfördes i rajsvingelsorterna Hykor och Paulita. Paulita är en korsning mellan ängssvingel och italienskt rajgräs och påminner i sitt växtsätt mest om engelskt rajgräs. Försöken i Paulita visar att radavstånd och utsädesmängd inte påverkar skördenivån signifikant.





# Etablering av rajsvingel

- Hykor gödslades i försöken med 40 kg/ha kväve på hösten och 100 kg/ha kväve på våren. Paulita gödslades med 100 kg/ha kväve på våren.
- Försöken genomfördes enbart i förstaårsvallar.
- I rajsvingel av rörsvingeltyp (Hykor och Felina) rekommenderas 12-24 cm radavstånd och en utsädesmängd på 8 kg/ha. 24 cm radavstånd rekommenderas om fröhalmen ska hackas.
- I rajsvingel av rajgrästyp (Paulita, Felopa och Perun) spelar radavstånd och utsädesmängd en mindre roll.
- Läs mer om försöken i Deleuran, L.C. et al. 2005. **Frøavl av rajsvingel (Festololium)**. Grøn Viden 313, 2005. Danmarks Jordbrugsforskning.