

Ogräsharvning på våren i ekologisk rödklöver



Tabell 1. Vårharvning i ekologisk rödklöver. 3 försök 2001-2002.	Skörd (kg/ha)	Renvaruhalt (%)	Planthöjd 15 juni (cm)
A. Obehandlat	187	97,8	56
B. En tidig harvning (ca 25 april)	183	97,0	41
C. Två tidiga harvningar (ca 25 april)	165	93,9	34
D. En sen harvning (ca 14 dagar senare)	171	96,9	42
E. Två sena harvningar (ca 14 dagar senare)	147	96,0	33
<i>LSD</i>	<i>ns</i>	<i>ns</i>	9

Vid harvningarna användes en vanlig kulturharv



Ogräsharvning på våren i ekologisk rödklöver

- Det fanns en tendens till mindre skörd och sämre renvaruhalt i försöksleden där man harvade klöver. Ju flera och ju senare harvningar desto sämre resultat.
- I ett försök fanns det mycket timotej. I övrigt fanns det mycket lite ogräs i försöken.
- Läs mer om försöken i Aamlid, T.S. & Øverland, J.I. 2003. **Vårharvning i økologisk rødkløverfrøeng**. Planteforsk Grøn forskning 1-2003, s 157-160. Norge