

Bekämpning av örtogräs i rörsvingel



Tabell 1. Bekämpning av örtogräs i rörsvingel. 1 försök 2004.	Skörd (kg/ha)	Örtogräs (plantor/m²)
A. Obehandlat	1 386	1
B. 1,0 tablett Express ST på hösten	1 402	0
C. 1,0 tablett Express ST + 0,1 l/ha DFF-Super på hösten	1 351	0
D. 0,15 l/ha Primus på våren innan sträckningsfasen (st. 29)	1 438	0
E. 0,075 l/ha Primus på våren innan sträckningsfasen (st. 29)	1 435	0
F. 0,075 l/ha Primus + 0,01 l/ha DFF-Super på våren innan sträckningsfasen (st. 29)	1 404	0
G. 1,25 l/ha Ariane FG S på våren i början av sträckningsfasen (st. 30)	1 398	0
H. 1,25 l/ha Ariane FG S + 0,075 l/ha Primus på våren i början av sträckningsfasen (st. 30)	1 431	0
<i>LSD</i>	<i>ns</i>	



Bekämpning av örtogräs i rörsvingel

- Det fanns nästan inget örtogräs i försöket så man kan inte dra slutsatser om de olika medlens bekämpningseffekt
- Försöket genomfördes främst för att undersöka om rörsvingeln tålde de utprovade medlen. Resultatet var lyckat eftersom ingen signifikant skördeminskning av behandlingarna konstaterades
- Läs mer om försöket i Pedersen, C.Å (red.). 2004. **Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt ("örtogräs") i frøgræs**. Oversigt over Landsforsøgene 2004, s 135, tabel 5. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret