

Sortförsök i timotej vid två olika kvävestrategier



Tabell 1. Sortförsök i timotej vid två olika kvävestrategier. 2 försök 1999 (Skåne och Södermanland)	Skörd (kg/ha)	Skörd, (Relativtal)
Alexander , 80 kg/ha N tidig vår (före 20 april)	849	100
Ragnar , 80 kg/ha N tidig vår	886	104
Grindstad , 80 kg/ha N tidig vår	868	102
Promesse , 80 kg/ha N tidig vår	743	88
Comtal , 80 kg/ha N tidig vår	789	93
Lischka , 80 kg/ha N tidig vår	990	117
Alexander , 50 kg/ha N tidig vår + 30 kg/ha N sen vår (ca 15 maj)	884	100
Ragnar , 50 kg/ha N tidig vår + 30 kg/ha N sen vår	772	87
Grindstad , 50 kg/ha N tidig vår + 30 kg/ha N sen vår	881	100
Promesse , 50 kg/ha N tidig vår + 30 kg/ha N sen vår	747	85
Comtal , 50 kg/ha N tidig vår + 30 kg/ha N sen vår	831	94
Lischka , 50 kg/ha N tidig vår + 30 kg/ha N sen vår	928	105

Sortförsök i timotej vid två olika kvävestrategier



- Utsädesmängden var 6 kg/ha i alla sorter
- Lischka gav högst skörd i Skåne oavsett kvävestrategi och högst skörd i Södermanland med en kvävegiva tidig vår. Grindstad gav högst skörd (1 104 kg/ha) i Södermanland vid delad kvävegiva
- Observera att det endast är ett års försök
- Läs mer om försöken i Larsson, G. 1999. **Sortförsök i Timotej**. Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare - Försöks- och forskningsrapport 1999