

Etablering av ängsgröe i vitklöver



Tabell 1. Bortsprutning av vitklöver i ängsgröe. 3 försök 2000-2001	Bekämpning av vitklöver* (%)	Ängsgröe plantbestånd vår (1-10)**	Skörd av ängsgröe (kg/ha)
Obehandlat	0	2	194
0,5 l/ha Matrigon, början av september	65	6	516
1,0 l/ha Matrigon, början av september	95	6	554
2*0,5 l/ha Matrigon, början av september och 3 veckor senare	95	4	540
0,5 l/ha Matrigon i början av september + 2,5 l/ha Ariane FG på våren	97		440
0,5 l/ha Matrigon i början av september + 1,0 l/ha Ariane Super på våren	79		357
3,5 l/ha Ariane FG på våren	69		175
1,75 l/ha Ariane Super på våren	50		239
<i>LSD</i>			<i>ns</i>

* Registrering maj månad; ** 10 = fullt bestånd

Etablering av ängsgröe i vitklöver



Tabell 2. Bortsprutning av vitklöver i ängsgröe. 5 försök 1998-1999	Bekämpning av vitklöver* (%)	Ängsgröe plantbestånd vår (1-10)**	Skörd av ängsgröe (kg/ha)
Obehandlat	5	7	941
2,0 l/ha Herbalon, början av september	100	10	1 082
2,0 l/ha Matrigon, början av september	100	10	1 096
2*1,0 l/ha Matrigon, början av september och 3 veckor senare	100	10	1 079
1,0 l/ha Matrigon i början av september + 3,5 l/ha Ariane FG på våren	100	10	1 098
3,5 l/ha Ariane FG på våren	93	7	1 013
<i>LSD</i>			<i>ns</i>

* Gradering maj månad; ** 10 = fullt bestånd



Etablering av ängsgröe i vitklöver

- Tabell 1 visar att man har fått bäst bekämpning av vitklövern vid behandling med 1,0 l/ha Matrigon på hösten eller 0,5 l/ha Matrigon på hösten + 2,5 l/ha Ariane FG på våren
- 1,0 l/ha Matrigon hade samma effekt som en splitbehandling med 2*0,5 l/ha Matrigon
- Tabell 2 visar äldre försök med högre doser av Matrigon och Ariane FG
- Vitklövern måste vara i god tillväxt vid sprutning
- Läs mer om försöken i Pedersen, C.Å (red.). 2001. **Bortsprøjtning af hvidkløver i engrapgræs.** Oversigt over Landsforsøgene 2001, s 137-138, tabell 4. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret