



# Etablering av ängsgröe i vitklöver

<b>Tabell 1. Bortsprutning av vitklöver i ängsgröe. 3 försök 2005</b>	Bekämpning av vitklöver* (%)	Örtogräs, täckning av jordytan (%)	Skörd av ängsgröe (kg/ha)
1,0 l/ha Matrigon, slutet av augusti	66	0	1 256
1 tablett/ha Express ST, slutet av augusti	64	0	1 278
1 tablett/ha Express ST + 1,3 l/ha NF-M 750, slutet av augusti	66	0	1 241
40 g/ha Hussar, slutet av augusti	67	0	1 261
40 g/ha Hussar + 1,3 l/ha NF-M 750, slutet av augusti	67	0	1 278
1,3 l/ha NF-M 750, slutet av augusti	64	0	1 259
<i>LSD</i>			<i>ns</i>

\*Registrering maj månad



# Etablering av ängsgröe i vitklöver

<b>Tabell 2. Bortsprutning av vitklöver i ängsgröe. 9 försök 2003-2005</b>	Bekämpning av vitklöver (%)	Örtogräs, täckning av jordytan (%)	Vitgröe, täckning av jordytan (%)	Skörd av ängsgröe (kg/ha)
1,0 l/ha Matrigon, slutet av augusti	77	11	1	886
1 tablett/ha Express ST, slutet av augusti	77	3	2	879
40 g/ha Hussar, slutet av augusti	91	0	1	910
<i>LSD</i>				<i>ns</i>

\*Registrering maj månad



# Etablering av ängsgröe i vitklöver

- NF-M 750 är en gammal fenoxisyra
- I försöken har Hussar gett bäst och stabilast effekt jämfört med Express ST
- En höstbekämpning måste eventuellt följas upp med en bekämpning på våren
- Förekomsten av vitgröe i försöken var mycket liten
- Vissa vitklöversorter (bl.a. Sonja) var svårare att bekämpa än andra
- Vitklövern måste vara i god tillväxt vid sprutning
- Läs mer om försöken i Pedersen, C.Å (red.). 2005. **Bortsprøjtning af hvidkløver**. Oversigt over Landsforsøgene 2005, s 143-144, tabell 1. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret