


Växtreglering och bekämpning av ogräs och svampsjukdomar i timotej



Tabell 1. Växtreglering och bekämpning av ogräs och svampsjukdomar i timotej. 2 försök 2006	Skörd (kg/ha)	Sprut- skada (%)	Planthöjd (cm)	Bladyta med svamp vid tröskning (%)
0,15 l/ha Primus vid växtstart	615	0	71	38
0,15 l/ha Primus vid växtstart + 2,67 l/ha CCC 750 st 31-35	845	8	61	60
0,15 l/ha Primus vid växtstart + 0,6 l/ha Moddus st 31-35	892	0	56	48
0,15 l/ha Primus st 31-35	620	0	71	45
0,15 l/ha Primus + 2,67 l/ha CCC 750 st 31-35	771	4	62	45
0,15 l/ha Primus + 0,6 l/ha Moddus st 31-35	817	3	59	45
0,15 l/ha Primus + 2,67 l/ha CCC 750+ 1,0 l/ha Amistar Duo st 31-35	909	10	56	30
0,15 l/ha Primus + 0,6 l/ha Moddus + 1,0 l/ha Amistar Duo st 31-35	885	7	58	18
<i>LSD</i>	<i>143</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>ns</i>

St 31-35 = begynnande sträckning

Växtreglering och bekämpning av ogräs och svampsjukdomar i timotej



- Försöken visar att Primus är skonsam mot timotej och effektiv mot baldersbrå
- Primus bör användas vid växtstart och inte blandas med stråförkortningsmedel
- Växtreglering gav stora och statistiskt signifikanta merskördar
- Svampbekämpning gav endast en liten merskörd. Fler försök behövs i äldre frövallar
- Läs mer om försöken i Aamlid, T.S. et al. 2007. **Kombinasjoner av Primus, vekstregulering og sopsprøjtning ved frøavl av timotei.** Bioforsk FOKUS 2 (2), s 134-139