

Bekämpning av vitgröe i ängsgröe



Tabell 1. <i>Fröskörd och bekämpningseffekt mot vitgröe i ängsgröe. 14 försök 2001-2004.</i>	Mindre än 5% av jordytan täckt av vitgröe i april (5 försök)		Mer än 5% av jordytan täckt av vitgröe i april (5 försök)	
	Skörd (kg/ha)	Vitgröe i rensad frö (%)	Skörd (kg/ha)	Vitgröe i rensad frö (%)
Obehandlat	805	0,1	810	1,0
200 g/ha Hussar, april	819	0,0	801	0,4
100 g/ha Hussar, april	806	0,0	802	0,5
200 g/ha Hussar, maj	743	0,0	768	0,4
100 g/ha Hussar, maj	776	0,0	804	0,4
100 g/ha Hussar, april + 100 g/ha Hussar, maj	801	0,0	811	0,2
<i>LSD</i>	<i>ns</i>		<i>ns</i>	



Bekämpning av vitgröe i ängsgröe

- Split-behandling med Hussar (2* 100 g/ha) har gett bäst effekt på vitgröen bland Hussarleden och den bästa nettomerskörden
- Skördeminskningarna vid Hussar-behandling är inte statistiskt signifikanta
- Som genomsnitt av 14 försök gav alla behandlingar med Hussar en statistisk signifikant minskning av vitgröe i frövaran
- Hussar bekämpar även många arter av örtogräs
- Läs mer om försöken i Pedersen, C.Å (red.). 2004. **Bekæmpelse af enårig rapgræs ("vitgröe") i engrapgræs.** Oversigt over Landsforsøgene 2004, s 132-133, tabell 3+4. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.