

# Bekämpning av svampsjukdomar och gräsogräs i ängsgröe



<b>Tabell 1.</b> Bekämpning av svampsjukdomar och gräsogräs i förstaårsvall av ängsgröe. 2 försök 2007-2008.	Skörd och merskörd (kg/ha)	Kärrgröe i rensade frö (%)	Rost (% täckning)	Herbicid-skada (0-10)*
Obehandlat	556	1,1	0,7	0
5 g/ha Monitor + 0,05 l/ha Hussar OD <sup>1)</sup> , april	14	0,3	-	1
10 g/ha Monitor + 0,05 l/ha Hussar OD <sup>1)</sup> , april	-61	0,5	-	1
10 g/ha Monitor <sup>1)</sup> , april	-73	0,5	-	1
0,25 l/ha Amistar, maj	18	0,8	0,04	-
0,25 l/ha Amistar + 0,25 l/ha Folicur EC 250, maj	20	1,1	0,02	-
0,4 l/ha Proline EC 250, maj	7	1,1	0,04	-
0,75 l/ha Bell, maj	16	1,4	0,2	-
<i>LSD</i>	<i>ns</i>			

<sup>1)</sup> + 0,5 l/ha Renol; \* 0 = ingen skada



# Bekämpning av svampsjukdomar och gräsogräs i ängsgröe

- Tabell 1 visar att Monitor och Monitor + Hussar OD endast har skadat grödan i begränsad omfattning
- Mängden av kärrgröe i den rensade frövaran reducerades med mer än 50%
- Det fanns nästan ingen vitgröe i försöken
- Svampbekämpning gav endast en liten merskörd pga svaga angrepp
- Läs mer om försöket i Pedersen, J.B (red.). 2008. **Bekæmpelse af græsukrudt og svampesygdomme i første års engrapgræs.** Oversigt over Landsforsøgene 2008, s 144, tabell 5. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret