






# Gödsling av rödsvingel sen vår





# Gödsling av rödsvingel sen vår



# Gödsling av rödsvingel sen vår



- Försöken genomfördes i sorten Pernille. Det finns stor skillnad på sorter av rödsvingel så resultatet kan bli annorlunda i andre sorter
- Försöken växtreglerades
- Den tidiga vårgödslingen genomfördes vid tillväxtstart och den sena vårgödslingen i mitten av maj
- Figur 1 och 2 visar att det endast är i fält med hög skördepotential att sen gödsling av rödsvingel på våren är lönsam.
- 2003 och 2004 gav den sena vårgödslingen ingen eller en mycket liten merskörd
- 2005 gav den sena vårgödslingen merskördar på 200-230 kg/ha frö om den tidiga vårgödslingen var 0 eller 30 kg/ha kväve. Med en tidig vårgödsling på 60 kg/ha kväve var merskörden endast ca 80 kg/ha

# Gödsling av rödsvingel sen vår



- Försöken visar att man måste göra en bedömning av skördepotentialen tidig vår innan man bestämmer sig för kvävestrategin
- En hög skördepotential definierades i försöken som ett stort antal fröbärande skott per kvadratmeter. 2003 fanns det 3 200 fröbärande skott per m<sup>2</sup> och 2005 4 500 fröbärande skott per m<sup>2</sup>
- Läs mer om försöken i Gislum, R. 2006. **Sen gödskning af rød svingel giver et merudbytte i nogle år, men hvilke år?** Frøavleren 2006-5, s 4-5. Dansk Landbrugs Medier