



Kvävegödsling av rödsvingel på hösten

Tabell 1. <i>Effekt av kvävegödsling på hösten på skörd mm. i andraårsvallar av rödsvingel.</i>	Kvävetillförsel i sista hälften av september efter första fröskörd	
	0 kg/ha N	62 kg/ha N
Antal fröbärande skott per m ²	2 444	2 998
Antal sterila skott per m ²	3 341	3 154
Antal frö per skott	40	38
Skörd (kg/ha)	1 060	1 190

Kvävegödsling av rödsvingel på hösten



- Det framgår inte av artikeln hur många försök som genomfördes eller om skillnaderna var statistiskt signifikanta
- Försöken visar att kvävegödsling på hösten ger fler fröbärande skott och att antalet fröbärande skott per m² är viktigare än antalet frö per skott för skörden i andraårsvallar av rödsvingel
- Rödsvingel bör alltid gödslas på hösten. Man kan inte kompensera grödan genom att gödsla mer på våren
- Danska beräkningar utifrån försöksresultat viste 2007 att den ekonomiskt optimala kvävegödslingen till rödsvingel var 63 kg/ha N på hösten och 67 kg/ha N på våren
- Läs mer om försöken i Gislum, R. 2007. **Fordel kvælstoffet optimalt mellem efterår og forår.** Frøavleren 2007-1, s 12-13. Dansk Landbrugs Medier