

# Vårgödsling av rödsvingel



<b>Tabell 1.</b> <i>Kväve till rödsvingel på våren. 19 försök 1999-2001</i>	Liggsäd (0-10); 10 = 100% liggsäd		Skörd och merskörd (kg/ha)
	Vid blomning	Vid skörd	
Ogödslat	1	3	1 040
20 kg/ha N vid tillväxtstart	2	4	86
40 kg/ha N vid tillväxtstart	3	6	137
60 kg/ha N vid tillväxtstart	4	7	181
20 kg/ha N vid tillväxtstart + 20 kg/ha N vid begynnande sträckning (st 31)	4	7	170
40 kg/ha N vid begynnande sträckning (st 31)	4	7	162
<i>LSD</i>			37

# Vårgödsling av rödsvingel



- Höstgödslingen i försöken varierade mycket. I sex försök 2001 tillfördes t ex 48-99 kg/ha kväve på hösten
- Tabell 1 visar att en kvävetillförsel på 60 kg/ha N gav bäst resultat
- Oavsett kvävemängden gav tillförsel av kväve på våren en statistisk signifikant skördeökning
- Det gav en högre skörd att tillföra 20 kg/ha N tidig vår och 20 kg/ha N sen vår jämfört med att tillföra 40 kg/ha N tidig vår
- Läs mer om försöken i Pedersen, C.Å (red.). 2001. **Kvælstof til rødsvingel.** Oversigt over Landsforsøgene 2001, s 144-145, tabell 12. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret