

Vårgödsling av rödsvingel



Tabell 1. <i>Kväve till rödsvingel tidig höst, sen höst och tidig vår. 2 försök i förstaårsvallar 2006-2007</i>	Liggsäd vid skörd (0-10); 0 = ingen liggsäd	Skörd och merskörd (kg/ha)
0 kg/ha N tidig höst + 75 kg/ha N sen höst + 45 kg/ha N tidig vår	3	1 104
30 kg/ha N tidig höst + 75 kg/ha N sen höst + 45 kg/ha N tidig vår	5	231
30 kg/ha N tidig höst + 45 kg/ha N sen höst + 45 kg/ha N tidig vår	5	292
0 kg/ha N tidig höst + 105 kg/ha N sen höst + 45 kg/ha N tidig vår	5	164
0 kg/ha N tidig höst + 75 kg/ha N sen höst + 77 kg/ha N tidig vår	7	292
<i>LSD</i>		<i>ns</i>

Vårgödsling av rödsvingel



- Försöket genomfördes för att undersöka om man kunde stärka insådden av rödsvingel med en tidig kvävegiva på hösten
- Kvävegödslingen genomfördes ca 1 september, ca 1 oktober och ca 1 mars
- Ett försök genomfördes i sorten Amarone och ett i sorten Cygnus
- Tabell 1 visar en tendens till merskörd om man delar kvävegivan på hösten insåningsåret. Skillnaderna är dock inte statistiskt signifikanta
- Läs mer om försöken i Pedersen, J.B (red.). 2007. **Kvälstof til rødsvingel**. Oversigt over Landsforsøgene 2007, s 160, tabell 5. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret