

Flytgödsel till rödsvingel på hösten



Tabell 1. Skörd och merskörd (kg/ha) i rödsvingel med/utan tillförsel av svinflyt på hösten. 11 försök 2006-2009	75 kg/ha N i NS 24-6 på hösten	75 kg/ha NH ₄ -N i svinflyt på hösten	105 kg/ha NH ₄ -N i svinflyt på hösten
0 kg/ha N på våren	1 385	1 262	1 315
30 kg/ha N i NS 24-6, mars	119	177	140
60 kg/ha N i NS 24-6, mars	192	272	247
90 kg/ha N i NS 24-6, mars	221	327	267
<i>LSD</i>	77	78	79

Flytgödsel till rödsvingel på hösten



- Alla försök tillväxtreglerades. Som flytgödsel användes svinflyt
- Försöken visar att både flytgödsel och mineralgödsel kan användas till rödsvingel på hösten. 2008 och 2009 fick man de högsta skördarna där man tillförde flytgödsel på hösten
- Man måste analysera flytgödseln för att kunna tilldela en korrekt mängd flytgödsel
- Den optimala totala kvävegivan i försöken var ca 160 kg/ha N
- Läs mer om försöken i Pedersen, J.B (red.). 2009. **Gylle ("flytgödsel") til rødsvingel**. Oversigt over Landsforsøgene 2009, s 148, tabell 6. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret