



Höstbehandling i rödsvingel

Tabell 1. Skörd i andraårsvallar i tre sorttyper av rödsvingel efter olika höstbehandlingar.	Skörd (kg/ha) i olika sorter av rödsvingel		
	Långa utlöpare	Korta utlöpare	Utan utlöpare
Fröhalm bortfört, obehandlat	1 169	1 209	1 249
Bränning av fröhalm direkt efter fröskörd	1 498	1 397	1 348
Fröhalm bortfört, putsning till 2-3 cm stubbhöjd direkt efter fröskörd	1 296	1 283	1 275

Det framgår inte av artikeln om skillnaderna i skördenivå är statistiskt signifikanta

Höstbehandling i rödsvingel



- Tabell 1 visar att bränning av fröhalmen är den bästa höstbehandlingen i rödsvingel. Bränningen måste genomföras så snabbt som möjligt efter fröskörd
- Bränning ger störst merskörd i sorter med långa utlöpare (ca 300 kg/ha frö) och minst merskörd (ca 100 kg/ha frö) i sorter utan utlöpare
- Mycket torra år kan en del plantor skadas av bränningen. En tuff putsning (2-3 cm stubbhöjd) är då bästa alternativet
- Danska erfarenheter och försök att det mycket viktigt att putsa direkt efter fröskörd. Om man väntar tre veckor med putsningen förlorar man ca 100 kg/ha frö jämfört med putsning direkt efter skörd
- Läs mer om försöken i Boelt, B. 2001. **Vilken höstbehandling kräver frövallen?** Svensk Frötidning 2001-6, s 4-5. Svensk Raps AB.