

Bekämpning av ogräs i höststråsäd med insådd av rödsvingel



Tabell 1. Bekämpning av gräsogräs i höstvetete med insådd av rödsvingel. 1 försök 2000-2001. Alla behandlingar (utom Primera Super) genomfördes på hösten i höstvetets 1-2 bladstadiet (st 11-12)	Plantbestånd rödsvingel oktober 2000 (1-10)*	Plantbestånd rödsvingel april 2001 (1-10)*
Ingen ogräsbekämpning	10	10
1,0 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Oxitril	10	10
1,0 l/ha Boxer + 0,5 l/ha Oxitril	7	8
1,0 l/ha Boxer + 0,5 l/ha Quartrol	5	8
2,0 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Oxitril	9	10
2,0 l/ha Boxer + 0,5 l/ha Oxitril	5	7
1,0 l/ha Boxer + 1,0 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Oxitril	6	8
0,5 l/ha Boxer + 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Oxitril	8	10
1,5 l/ha Quartrol + i april: 1,0 l/ha Primera Super + 0,5 l/ha Actirob	10	10

* 0 = alla plantor är döda; 10 = full plantbestånd (ingen skada)

Bekämpning av ogräs i höststråsäd med insådd av rödsvingel



- Försöket skördades inte
- I försöket gav alla höstbehandlingar en bekämpningseffekt på 80-100% mot vitgröe
- Boxer skadade rödsvingelinsådden betydligt mer än Stomp och Quartrol
- I en annan försöksserie såg man mycket kraftigare skadar på rödsvingel och hundäxing etablerad med frösålåda än på rödsvingel och hundäxing etablerad med såskär (vanlig såmaskin). Om man ska genomföra en bekämpning av gräsogräs på hösten med de utprovade medlen måste rödsvingeln sås på 2 cm djup.

Bekämpning av ogräs i höststråsäd med insådd av rödsvingel



- Läs mer om försöken i Pedersen, C.Å (red.). 2001.
Bekæmpelse af ukrudt i vintersæd med udlæg af rødsvingel. Oversigt over Landsforsøgene 2001, s 142, tabell E23. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret