

Bekämpning av baldersbrå och annat örto­gräs i rödsvingel



| Tabell 1. Bekämpning av baldersbrå mm i rödsvingel. 1 försök 2001. Alla behandlingar genomfördes 24 april 2001 | Skörd och merskörd (kg/ha) | Örto­gräs 21 dagar efter behandling (plantor/m ²) | Baldersbrå, % täckning av jordyta innan skörd |
|---|----------------------------|---|---|
| Ingen ogräsbekämpning | 1 711 | 7 | 1 |
| 1,75 l/ha Ariane Super | 29 | 2 | 0,1 |
| 0,15 l/ha Primus | 4 | 2 | 0 |
| 0,75 kg/ha Platform T | 12 | 3 | 0,3 |
| 4,0 l/ha Basagran M75 | 33 | 2 | 0 |
| 2,5 l/ha Ariane FG | 12 | 2 | 0,3 |
| 20 g/ha Gratil 75 WG | -15 | 4 | 0,4 |
| <i>LSD</i> | <i>ns</i> | | |



Bekämpning av baldersbrå och annat örto­gräs i rödsvingel

- Försöket visar att flera olika medel gav en bra bekämpning av örto­gräs i rödsvingel.
- Skillnaden mellan behandlingarna var inte statistiskt signifikanta
- Det fanns endast lite örto­gräs i försöket
- Läs mer om försöken i Pedersen, C.Å (red.). 2001. **Kamille ("baldersbrå") og andet ukrudt i frøgræs.** Oversigt over Landsforsøgene 2001, Tabelbilag, tabell E31. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret