



Etablering av engelskt rajgräs mellan skyddsgrödans rader?

Tabell 1. Etablering av engelskt rajgräs (*Borvi* – diploid fodersort) i vårkorn (*Meltan*, 24 cm radavstånd, 125 kg/ha). 3 försök 1997-1999.

1. Engelskt rajgräs (6 kg/ha) etableras i samma rad och med samma såbill som skyddsgrödan

2. Engelskt rajgräs (8 kg/ha) etableras i samma rad och med samma såbill som skyddsgrödan

3. Engelskt rajgräs (6 kg/ha) etableras i samma rad som skyddsgrödan med en egen såbill (specialmaskin)

4. Engelskt rajgräs (6 kg/ha) etableras i en egen rad 2 cm från skyddsgrödans rad

5. Engelskt rajgräs (6 kg/ha) etableras i en egen rad 6 cm från skyddsgrödans rad

6. Engelskt rajgräs (6 kg/ha) etableras i en egen rad 12 cm från skyddsgrödans rad, dvs mittemellan skyddsgrödans rader



Etablering av engelskt rajgräs mellan skyddsgrödans rader?

- Försöksled 5 gav högst skörd som medeltal för de tre försöksåren, medan försöksled 3 gav lägst skörd
- Skillnaderna var dock mycket små och inte statistiskt signifikanta
- Läs mer om försöken i Deleuran, L.C. et al. 2006. **Etablering af frøgræs i økologisk jordbrug.** NJF Seminarium 395 "Herbage Seed Production", 12-14 juni 2006