



Kväve på hösten till engelskt rajgräs?

Tabell 1. <i>Kväve (N) på hösten till engelskt rajgräs inför första fröskördeåret. 2 försök 2006-2007</i>	Skörd och merskörd (kg/ha)	Planthöjd hösten 2006 (cm)	Liggsäd vid skörd (0-10)*
Ingen höstgödsling, 130 kg/ha N mars 2007	1 016	8	7
30 kg/ha N i början av september 2006 + 130 kg/ha N mars 2007	-30	15	7
30 kg/ha N i början av september 2006 + 100 kg/ha N mars 2007	-61	15	6
Ingen höstgödsling, 160 kg/ha N mars 2007	-3	8	8
Ingen höstgödsling, 190 kg/ha N mars 2007	-5	8	9
<i>LSD</i>	<i>ns</i>		

* 0 = ingen liggsäd; 10 = 100% liggsäd

Kväve på hösten till engelskt rajgräs?



- Båda försöken etablerades i vårkorn
- Tabell 1 visar att standardrekommendationen om att väletablerade insådder av engelskt rajgräs inte behöver kväve på hösten insåningsåret fortfarande gäller
- Det har inte varit lönsamt att tillföra mer än 130 kg/ha N i försöken
- Läs mer om försöken i Pedersen, J.B. (red.). 2007. **Efterårstilførsel af kvælstof til alm. rajgræs.** Oversigt over Landsforsøgene 2007, s 167, tabell 13. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.