

Bekämpning av rost och bladfläck- sjukdomar i engelskt rajgräs



Tabell 1. Bekämpning av svampsjukdomar i engelskt rajgräs. 2 försök 2000. <i>Bekämpningen genomfördes vid begynnande angrepp</i>	Skörd och merskörd (kg/ha)	Bladfläck, % täckning av bladyta 3 veckor efter behandling	Rost, % täckning av bladyta 3 veckor efter behandling
Obehandlat	749	14 respektive 0,6	1 respektive 8
0,5 l/ha Tilt Top	96	4 resp. 0	0 resp. 1
0,8 l/ha Stereo 312,5 EC + 0,5 l/ha Tern	87	8 resp. 0	0 resp. 1
0,5 l/ha Folicur	105	4 resp. 0	0 resp. 2
1,0 l/ha Amistar Pro	151	3 resp. 0	0 resp. 1
0,5 l/ha Tern	83	8 resp. 0	0 resp. 1
<i>LSD</i>	67		

Bekämpning av rost och bladfläck- sjukdomar i engelskt rajgräs



- I ett av försöken fanns betydande angrepp av rost och i det andra betydande angrepp av bladfläcksjukdomar
- Alla behandlingar gav statistiskt signifikanta merskördar. 1,0 l/ha Amistar Pro gav högst merskörd både i försöket med rostangrepp och i försöket med bladfläcksjukdomar
- Läs mer om försöken i Pedersen, C.Å. (red.). 2000. **Sygdomme på alm. rajgræs.** Oversigt over Landsforsøgene 2000, Tabelbilag, tabell E28. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret