

# Vårgödsling av förstaårsvallar av rödsvingel



<b>Tabell 1.</b> <i>Kväve (N) till förstaårsvallar av rödsvingel (sort = Maxima) på våren. 2 försök 2008</i>	Liggsäd vid skörd (0-10); 0 = ingen liggsäd	Skörd och merskörd (kg/ha)
20 kg/ha N, mars	0	2 058
40 kg/ha N, mars	0	156
60 kg/ha N, mars	0	260
80 kg/ha N, mars	0	280
20 kg/ha N, mars + 20 kg/ha N, maj	0	141
40 kg/ha N, mars + 20 kg/ha N, maj	0	221
<i>LSD</i>		119

# Vårgödsling av försteårsvallar av rödsvingel



- Försöken växtreglerades
- Höstgödslingen var inte den samma i de två försöken – ett försök fick 74 kg/ha N i mineralgödsel medan det andra försöket fick 90 kg/ha  $\text{NH}_4\text{-N}$  i svinflyt
- Den ekonomiskt optimala kvävemängden (danska priser 2008) var 74 kg/ha N på våren
- Det gav ingen merskörd att dela på kvävegödslingen
- Mängden liggsäd påverkades inte av kvävestrategin i försöken. Generellt fanns det nästan ingen liggsäd i rödsvingel 2008
- Läs mer om försöken i Pedersen, J.B (red.). 2008. **Kvælstof til rødsvingel om foråret**. Oversigt over Landsforsøgene 2008, s 145, tabell 6. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret