

# Bekämpning av vitgröe i rödsvingel höst och vår



<b>Tabell 1. Bekämpning av vitgröe i rödsvingel. 1 försök 2009.</b>	Herbicid-skada (1-10)*	Vitgröe, täckning av jordyta vid skörd (%)	Skörd och merskörd (kg/ha)
1. Obehandlat	0	70	1 106
2. 0,02 l/ha Hussar OD <sup>1)</sup> i september	0	50	35
3. 0,05 l/ha Hussar OD <sup>1)</sup> i september	0	26	60
4. 2,0 l/ha Boxer EC i augusti	0	65	-28
5. 2,0 l/ha Boxer EC i augusti + 0,05 l/ha Hussar OD <sup>1)</sup> i september	0	25	84
6. 2,0 l/ha Boxer EC i augusti + 0,05 l/ha Hussar OD <sup>1)</sup> i september + 0,05 l/ha Hussar OD <sup>1)</sup> i april	0	20	45
7. 0,05 l/ha Hussar OD <sup>1)</sup> i september + 0,05 l/ha Hussar OD <sup>1)</sup> i april	0	19	48
<i>LSD</i>			<i>ns</i>

<sup>1)</sup> + 0,5 l/ha Renol; \* 0 = ingen herbicidskada, 10 = alla plantor är döda

# Bekämpning av vitgröe i rödsvingel

## höst och vår



- Bedömningen av herbicidskada gjordes 21 dagar efter sista behandling, dvs i maj månad
- 0,02 l/ha Hussar i september eller 2,0 l/ha Boxer i augusti har inte gett en tillräcklig bra effekt mot vitgröe
- 0,05 l/ha Hussar på hösten har däremot gett en bra bekämpning
- Läs mer om försöken i: Pedersen, J.B (red.). 2009. **Bekæmpelse af enårig rapgræs ("vitgröe") i rødsvingel.** Oversigt over Landsforsøgene 2009, s 149-150, tabell 10. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret